

登園許可書

病名「」園児名

令和 年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので、登園可能と判断します。

医療機関名

醫師名

本園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症発生や流行を出来るだけ防ぐことで一日快適に生活できるよう、ご理解ご協力をお願い致します。なお、下記の感染症について「登園許可書」の提出をお願いしております。また、お子様が集団での生活が可能な健康回復状態となつてからの登園であるようにご配慮をお願い申し上げます。

（学校法人和光学園・認定こども園くさかべ幼稚園）

✓	感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
	麻疹（はしか）	発症1日前から発しん出現後の4日後まで	解熱後3日を経過してから
	インフルエンザ	症状がある期間（発症前24時間から発症後3日程度までが最も感染力が強い）	発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで
	風しん	発しん出現の前7日から後7日間くらい	発疹が消失してから
	水痘（水ぼうそう）	発しん出現1～2日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂（か）皮化してから
	流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発症3日前から耳下腺腫脹後4日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
	結 核	半年から2年間	医師により感染の恐れがないと認めるまで
	コロナ感染症	頭痛、喉の痛み、食欲不振、嗅覚障害、疲労、胸部不快感、胃腸炎、重度の下痢などの風邪に似た症状。発症後5日間は感染リスクが高い。	発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
	咽頭結膜熱（プール熱）	発熱、充血、目やに等症状が出現した数日間	主な症状が消えて2日経過してから
	流行性角結膜炎	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから
	百 日 咳	咳抗菌薬を服用しない場合、咳出現後、3週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで、又は5日間の適性な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
	管出血性大腸菌感染症 （O157、O26、O111等）	便中に菌が排泄されている間。10時間から6日間	症状が治まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認された場合
	急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される	医師により感染の恐れがないと認めるまで
	髄膜炎菌性髄膜炎	発症から4日以内	医師により感染の恐れがないと認めるまで